

Kategori: Pasientbehandling/Legemidler	Gyldig fra/til: 24.11.2021/24.05.2023
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.00
Godkjenner: Kristensen, Aina Nærø	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Bente Vee / avdelingsoverlegen/farmasøyt	Dok.id: D33595

Medikament	Holdbarhet i romtemp. etter åpning	Kommentarer
Buscopan inj. 20 mg/ml amp	Engangsbruk _{1,2}	
Lidocain inj. 10 mg/ml hetteglass	12 timer ₂	Kan deles på flere pasienter: opptrekkskanyle blir stående med steril propp. Hetteglass skiftes da daglig. Kan oppbevares i kjøleskap i 24 t etter anbrudd
Heparin 100 i.e./ml hetteglass	4 uker ₁	
Heparin 5000 i.e./ml hetteglass	4 uker ₄	
Midazolam inj 1mg/ml ampulle	Engangsbruk _{1,2}	
Morfin inj. 10 mg/ml ampulle	engangsbruk	
Iomeron inj. alle styrker	10 timer ₁	Etter åpning/gjennom boring av flaskepropp
Omnipaque inj. alle styrker	24 timer ₁	Etter åpning/gjennom boring av flaskepropp
Gastrografin	3 døgn ₁	
Dotarem, hetteglass	Engangsbruk ₁	Brukes til babyer
Clariscan 0.5 mmol/ml, ferdig utfylt sprøyter	Engangsbruk ₁	
Primovist, ferdigfylt sprøyter 0,25mmol/ml	Engangsbruk ₁	
Gadovist, ferdigfylt sprøyter 1mmol/ml	Engangsbruk ₁	
Glucose plastflaske infusjon	12 timer ₂	SIRT-behandling
Iomeron ₃ /Omnipaque _{1,4} til oralt / rektalt bruk	3 døgn	Grunnet kjemisk ustabilitet iflg RELIS (føre var prinsipp etter kontakt med RELIS)
NaCl 500ml og 100 ml Infusjonspose/ plastflaske:	24 t ₂	Merkes med dato/klokkeslett Overposen bør beholdes på til infusjonen skal brukes.
Plastampulle	<u>Plastampulle</u> : engangsbruk	
Klorhexidin sprit 5 mg/ml (med og uten farge)	3 mnd ₃	Merkes med dato
Klorhexidin 0,5 mg/ml	1 uke ₃	Merkes med dato

Kilder:

- 1: Felleskatalog/SPC lest 02/2018
- 2: Norsk legemiddelstandard publisert 02.01.18
- 3: Lokal vurdering godkjent av medisinsk ansvarlig
- 4: Informasjon fra kontakt med produsent tlf eller e-mail