HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400, 5021 Bergen

**Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Tlf.: 55 97 24 70**

Rekvirentkode

Rekvirentnamn og adresse

Fødselsnr

Namn

Adresse

Poststad ☐ Kvinne ☐ Mann

Betalast av
☐ Trygdekontor ☐ Institusjon ☐ Bedrift

Prøven tatt dato kl

Prøvetakar

Klinisk problemstilling:

☐ Kopi er ønska til:

## SVANGERSKAPSANALYSAR

TERMIN:

☐ **1. prøve i svangerskap - veke 6-12**
Infeksjonsserologiske analysar, sjå baksida

☐ **Føtal RHD-typing*, RhD-negativ - veke 24**

Blodtypeantistoff påvist tidlegare, kva type?

Behandla med RhD-profylakse siste 6 mnd., indikasjon, dato?

Ved kva sjukehus skal den gravide føde?

## TRANSFUSJONSMEDISINSKE ANALYSAR

☐ **Blodtyping, ABO/ RhD-typing**

☐ **Pretransfusjonsprøve**
ABO/RhD-typing/ antistoffscreening, sjå baksida

☐ **Antistoffutgreiing**

☐ **DAT, direkte antiglobulintest**

☐ **Transfusjonsreaksjon,** sjå baksida

☐ **Ny blodgivar, kontrolltyping**

## BESTILLING AV BLODPRODUKT

**TAL**

☐ **Erytrocyttkonsentrat**

☐ **Trombocyttkonsentrat**

☐ **Plasma**

☐ **Andre blodprodukt**

☐ **Bestrålt**

☐ **HLA-forlikeleg** (etter avtale)

**Planlagt transfusjon:** dato/ kl.

**Rekvirerande lege**

## DIVERSE ANALYSAR

☐ **HbF, kvantitering** føtomaternell blødning (etter avtale)

☐ .....

☐ **Prosjektprøve, ID** .....

**Andre analysar**

☐ .....

☐ .....

Byråservice AS - 202 073 - 05.2020 (redigert 10 2026)

# PRØVETAKING OG SENDING AV PRØVAR

| | |
|---|---|
| **Svangerskapsanalysar:** | **6 ml EDTA-blod,** 1. prøve i svangerskap bør takast i veke 6 - 12. Infeksjonsserologiske analysar kan rekvirerast på skjema frå Mikrobiologisk avdeling.<br>Ved tidlegare kjent antistoff trengst **6 ml EDTA-blod x 2**<br>***6 ml EDTA-blod x 2** til føtal RHD-typing og **6 ml EDTA-blod** til antistoffscreeining av RhD-negative gravide i veke 24.<br>Uopna glas til føtal RHD-typing må vere på laboratoriet innan 7 døgn. |
| **Blodtyping/pretransfusjonsprøve:** | **6 ml EDTA-blod.** Før blodtransfusjon skal pasienten vere **blodtypa i to prøvar tatt på ulike tidspunkt.** Dersom pasienten tidlegare er blodtypa ved denne blodbanken trengst berre ein prøve til pretransfusjonsanalysen. Resultat av antistoffscreeining er gyldig i 4 døgn etter prøvetaking, dvs. prøven må ikkje vere over 4 døgn på transfusjonstidspunktet. |
| **DAT, direkte antiglobulintest:** | **3 ml EDTA-blod,** påvisar antistoff bunde til erytrocyttane. |
| **Antistoffutgreiing:** | **6 x 2 ml EDTA-blod,** utgreiing av antistoff påvist ved annan blodbank. |
| **Ny blodgivar, kontrolltyping:** | **3 ml EDTA-blod,** kontrolltyping av blodgivar frå annan blodbank. |
| **Transfusjonsreaksjon:** | **6 ml EDTA-blod, 2 x 3,5 ml serumrør med gel (ev. avpipettert plasma)**<br>Dette er ein analysepakke der det i tillegg til utgreiing retta mot hemolytisk transfusjonsreaksjon (v/AIT), også kan bli gjort analysar med formål å avdekke allergiske transfusjonsreaksjonar (v/MBF). Transfusjonssett, produktpose og blodprøvar samt kopi av transfusjonsjournal med utfylt nederste del skal sendast inn straks etter avbroten transfusjon.<br>Dersom analysar for utgreiing av allergisk transfusjonsreaksjon er ønskeleg, må prøve tatt før reaksjon, eller ev. tatt meir enn 12 timar etter symptomstart bli sendt med. (Ved sending av plasma, avpipetterast dette til eige rør).<br>Gode kliniske opplysningar med skildring av symptom og relasjon av desse til transfusjonen, samt opplysningar om medikament er nødvendige for riktig utgreiing og tolking av analysane. |
| **HbF:** | **3 ml EDTA-blod,** prøve etter avtale, ved mistanke om føtomaternell bløding eller ved mistanke om hemoglobinopati. |

**Utvida informasjon om analysane og oversikt over andre tilgjengelege analysar finn du på:**
*www.analyseoversikten.no*

**ANALYSERESULTAT MÅ IKKJE NYTTAST I VITSKAPLEGE PUBLIKASJONAR UTEN LØYVE FRA AVDELINGSSJEFEN**