

Kategori: []	Gyldig fra/til: 31.07.2025/31.07.2027
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Barne- og ungdomsklinikken/Nyføddintensiv	Versjon: 3.00
Godkjenner: Anne-Siri Fonneland	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Anne-Siri Fonneland	Dok.id: D12796

Innledning	Kan være aktuelt når barnet <ul style="list-style-type: none"> - brekker seg - er kvalm - har stygt aspirat, for eksempel etter å ha svelget misfarget fostervann
Forberedelse	<u>Utstyr</u> <ul style="list-style-type: none"> - sonde nr 6 eller 8 - 2 sprøyter á 10 eller 20ml - Pussbekken - Sterilt vann - NaCl 9mg/ml
Fremgangsmåte	<ul style="list-style-type: none"> - Aspirér og kast stygt ventrikkelinhold - Sett ned like deler Sterilt vann og NaCl 9mg/ml, for eksempel 5ml sterilt vann/ 5 ml NaCl 9mg/ml - Trekk opp igjen med en gang. Sørg for å trekke opp like mye som du setter ned - Gjenta prosedyren til klart aspirat
Anbefalt Litteratur	Avdelingen har mangler evidens- erfarings basert prosedyre. Ingen kjent litteratur.