

 <b>HELSE BERGEN</b> Haukeland universitetssjukehus	<h2>Amnioninfusjon</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 20.12.2023/20.12.2025
Organisasjon: Helse Bergen HF/Kvinneklivnikken/Fødeavdelingen	Versjon: 2.00
Godkjenner: Linde, Lorentz Erland	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Mascali Ferenc	Dok.id: D13911

### Indikasjoner

1. Oligohydramnion **og** variable deselerasjoner
2. Tykt, mekoniumtilblandet fostervann **og** variable deselerasjoner

### Utstyr

1. 1 liter Ringer av kroppstemperatur (finnes på operasjonsstuen).
2. Vanlig intravenøst infusjonssett
3. Lofric Insti-Cath Nelaton CH 14 (kateter, finnes på fødeavdelingen)

### Fremgangsmåte

1. Placenta lokaliseres med ultralyd transabdominalt
2. Posen med Ringer henges ca. 1 meter over pasienten. Infusjonssett og kateter kobles til Ringerposen og fylles med væske. Infusjonspumpe brukes ikke.
3. Kateteret føres inn gjennom cervix og videre opp mellom fosterhodet og uterinveggen. Dersom placenta ligger over mot en av uteri sider, føres kateteret inn på motsatt side. Det innføres ca. 20 cm.
4. Infusjon av Ringer 500 ml på ca 20 minutter (25 ml per minutt  $\approx$  8 dråper per sekund)
5. Kateteret fjernes

Det er normalt at noe av væsken renner ut igjen. Dersom mye av væsken renner ut og/eller variable deselerasjoner oppstår igjen senere, kan infusjonen gjentas. Kontinuerlig infusjon av 3 – 4 ml/min er også mulig.