

Kategori: Pasientbehandling/Smittevern	Gyldig fra/til: 27.05.2024/27.05.2027
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 4.04
Godkjenner: Dorteia Hagen Oma	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Dorteia Hagen Oma	Dok.id: D19455

## Innhold

1	Hensikt .....	1
2	Målgruppe og avgrensning .....	1
3	Gjennomføring.....	1
4	Referanser.....	1
5	Endringer siden forrige versjon.....	2

## 1 Hensikt

- Hindre overføring av forurensing og mulig smitte ved arbeid med pasienter
- Forebygge smitte til og mellom pasienter
- Beskytte helsepersonell mot smitte.

## 2 Målgruppe og avgrensning

Alle ansatte

## 3 Gjennomføring

Hvordan:

- Bruk aseptisk teknikk og sterilt injeksjonsutstyr
- Bruk sterilt infusjonssett
- Membraner på hetteglass desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel
- Bruk ny sprøyte på hver pasient, selv om spissen skiftes
- Bruk engangsampuller/en-dose hetteglass framfor flerdose hetteglass
- Ikke bruk samme engangs ampulle/en-dose hetteglass til flere pasienter. Ikke spar på rester til senere bruk
- Dersom flerdose hetteglass benyttes, bruk ny steril spiss og sprøyte hver gang membranen perforeres
- Flerdose hetteglass oppbevares på medisinrommet og ikke nærheten av pasientbehandling
- Bruk gjerne prefylte sprøyter ved skylling av venekanyler

## 4 Referanser

Interne referanser

Eksterne referanser

[2.12.27 Basale smittevernrutiner, trygg injeksjonspraksis](#)

[2.12.22 Stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer - veileder for helsepersonell.  
FHI](#)

## 5 Endringer siden forrige versjon

Forlenget gyldighet til 27.05.2027