

Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til:04.07.2024/04.07.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Øyeavdelingen	Versjon: 2.03
Godkjenner: Jenssen, Frank Tore	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Hans Olav Ueland	Dok.id: D22407

Symptomer / anamnese:

Fremmedlegeme-fornemmelse. Svie. Kløe. Ømfintlighet for sigarettøyk. Mer uttalte symptomer enn objektive funn. Varighet over 3 måneder.

Funn:

Lett konjunktival injeksjon.

Etiologi:

Kronisk irritasjonstilstand. Kan forekomme som ikke tilhelet akutt konjunktivitt. Sensible konjunktivale slimhinner. Ofte ukjent årsak.

Differential diagnoser:

- Allergisk konjunktivitt.
- Keratokonjunktivittis sicca.
- Blefaritt.
- Entropion/Ektropion/Trikiasis.
- Kontaktlinserelatert.
- Dakryocystitt.
- Refraksjonsanomali.

Behandling:

- Fucithalmic x 2 eller Kloramfenikol øyedråper x 3-6 i 8-10 døgn kan forsøkes.
- Kunstig tårevæske ved behov. (f.eks Artelac øyedråper x 6).
- Korrigere refraksjonsanomali.
- Unngå røyk, vind, kulde, maskara og øyemidler med konserveringsmidler.
- Spersadex m/kloramfenikol i en kort nedtrappende kur (f.eks øyedråper x 4 i en uke, deretter x 2 i en uke).