

Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 17.10.2022/17.10.2024
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Øyeavdelingen	Versjon: 4.02
Godkjenner: Jenssen, Frank Tore	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Nils Bull	Dok.id: D22415

Synonym: Hydrops cornea

Kraftig og avgrenset cornea-ødem pga rumpert Descemets membran i keratokonusøye. Vanligere hos pasienter som gnir seg mye i øynene. Ser mer dramatisk ut enn det er. Seidels test. Perforasjon svært sjelden (unngå gniing og lokale steroider).

Symptomer

Akutt synssvekkelse. Kraftig ruskfølelse og ubehag. Fotofobi. Øket tåresekresjon. Rødt øye.

Behandling

- NaCl 5 % øyedråper x 6. Svir.
- Kloramfenikol øyedråper x 4 (ihvertfall ved evt epiteldefekt)
- (Dårlig fungerende psykisk utviklingshemmede trenger ikke tvangsdryppes, men kan få en dråpe Kloramfenikol i øyekroken når de sover). Ødemet går tilbake spontant (kan ta måneder og går seinere uten NaCl 5 %) og etterlater makel.
- Ved evt perforasjon skal pas. innlegges.
- Kontroll etter 2-4 uker.