

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	CHALAZION H00.1
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til:01.07.2024/01.07.2027
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Øyeavdelingen	Versjon: 2.02
Godkjenner: Jenssen, Frank Tore	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Dag Einar Lysebo	Dok.id: D22434

### **Symptomer / anamnese:**

Smerteløs knute / hevelse på øyelokket.

### **Funn:**

Indolent, fast hevelse i tarsalplaten. Evertering kan vise polypoid granulom på palpebrale konjunktiva. Blefaritt.

### **Etiologi:**

Sekretstuvning med betennelse i Meibomsk kjertel.

### **Behandling:**

Initialt ekspektans, små chalazion kan spontant forsvinne. Kloramfenikol salve for å dempe symptomtopper. Ved persisterende lesjon over 4 uker kan det gjøres insisjon og utskrapning av cyste. Vertikalt snitt med 11-blad fra konjunktivalside med hjelp av chalazionklemme. Residiv (hos eldre pas.): Talgkjertel-carcinom? Diff.diagn: BCC. Biopsi.