

 HELSE BERGEN <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>HORDEOLUM H00.0</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 01.07.2024/01.07.2027
Organisasjon: Helse Bergen HF/Øyeavdelingen	Versjon: 2.03
Godkjenner: Jenssen, Frank Tore	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Dag Einar Lysebo	Dok.id: D25125

(Sti = ekstern hordeolum)

Symptomer / anamnese:

Smertefull øyelokkskant.

Funn:

- Ekstern:
Liten absess ved margo.
- Intern:
Hevelse i preaurikulære lymfeknuter. Lokalisert rubor og ødem i øyelokket. Pustel. Spontan drenering. Konjunktival injeksjon.

Etiologi:

- Ekstern:
Infeksjon i hårfollikkel og ledsagende Molls / Zeiss kjertel.
- Intern:
Infeksjon i Meibomske kjertler. Forårsakes av stafylokokker, sjeldnere streptokokker.

Behandling:

- Ekstern:
Ekspektans. Spontan bedring. Varme omslag. Epilering av assosierte cilier. Behandle event. preseptal cellulitt.
- Intern:
Kloramfenikol øyedråper x 6 i begge øyne i 5 dager, deretter 4 dråper i 5 dager.
Kloramfenikol øyesalve vesper. Behandle event. preseptal cellulitt. Ved manglende bedring insisjon og utskrapning etter akutt-fasen.