

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2 style="margin: 0;">Amniocentese og CVS</h2>	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 28.05.2021/28.05.2023	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Kvinnelinklinikken/Seksjon for fostermedisin og ultralyd	Versjon: 3.00	
Godkjenner: Albrechtsen, Susanne	Prosedyre	
Dok. ansvarlig: Synnøve Lian Johnsen	Dok.id: D29880	

Alle invasive prosedyrer skal registreres i prenatal databasen på KK

Amniocentese

Amniocentese skal helst ikke utføres før etter uke 15.0

Diagnostisk amniocentese:

- Skriftlig samtykke fra kvinnen hvis prøve til kromosomanalyse
- Dekk opp sterilt; bolle, store tuffere, klorhexidin 5mg til vasking.
- Vask bukveggen
- Bruk 0,6 eller 0,8 mm nål
- UL veiledet frihåndsteknikk eller med guide
- Sett på treveiskran på nålen, aspirer 15 ml fostervann
- Hvis RhD neg kvinne, gi Rhesogamma profylakse

Terapeutisk amniocentese:

- Vurder profylaktisk Celeston
- Dekk opp sterilt
- Vask bukvegg
- Bruk 1,2 mm nål
- Sett litt lokalanestesi
- Koble til sug og aspirer langsomt over i hvert fall en 20 min. periode, max 5 liter
- Hvis RhD neg. kvinne, gi Rhesogamma profylakse
- Vurder om prøve skal sendes til kromosomanalyse eller andre undersøkelser

Chorion villus sampling, CVS (morkakeprøve)

Gjøres mellom uke 11 og 14 (15), vurder tilgjengelighet av morkaken

- Skriftlig samtykke fra kvinnen hvis prøve til kromosomanalyse
- Lokaliser morkakens beliggenhet
- Ha full urinblære
- Gyn.leie
- Dekk opp sterilt
- Vaginal vask
- Selvholdende spekel
- Ta prøve via cervix under transabdominal UL veiledning
- Kontrollere at representativt materiale ved mikroskopi
- Hvis RhD neg kvinne, gi Rhesogamma profylakse
- Kontrollprøve av mor, EDTA blod

Referanser

<https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselsjelp/prenatal-diagnostikk/>