

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2 style="text-align: center;">4.2 JOD-kontrast : AKUTTE bivirkninger, risikofaktorer og risikoreduksjon</h2>	
Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til: 04.01.2024/04.07.2024	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.01	
Godkjenner: Kristensen, Aina Nærø	Retningslinje	
Dok. ansvarlig: HMS- og kvalitetskoordinator /avdelingsoverlege	Dok.id: D32606	

A) Risikofaktorer for en akutt bivirkning

Pasient relaterte

Pasient med følgende anamnese:

- Tidligere moderate eller alvorlige bivirkninger) ved injeksjon av jodholdig kontrast (se [klassifisering kontrastmiddelreaksjoner](#))
- Astma.
- Allergi som krever medisinsk behandling.

Kontraststoff relaterte

- Høy-osmolære ioniske kontraststoffer (ikke i bruk ved Rad.avdeling , HUS)

B) Risikoreduksjon for en akutt bivirkning

For alle pasienter

- Bruk avdelingens standard kontrastmiddeltyper. Se oversikt [2.1.1 Kontrastmiddeltyper ved Radiologisk avdeling](#)
- Hold øye med pasienten i 30 minutter etter injeksjon av kontraststoffet.
- Ha legemidler og utstyr klar med henblikk på behandling, se også [4.4 Behandling av akutte kontrastmiddelreaksjoner](#)

For pasienter som har en økt risiko for å reagere (se risiko faktorer ovenfor)

- Vurder en alternativ undersøkelse som ikke krever et jodholdig kontraststoff.
- Bruk et annet jodholdig kontraststoff til pasienter som tidligere har reagert på et kontraststoff.
- Premedisinering. Klinisk bevis for effekten av premedisinering er begrenset. Hvis man ønsker og pre-medisinere, se prosedyre:

[5.8 Forbehandling ved tidligere allergilignende kontrastmiddelreaksjon](#)

Premedisinering skal alltid gjøres i samråd med pasientens fastlege /behandlende lege.

Ekstravaskulær administrasjon av jodholdig kontraststoff

Hvis lekkasje av kontraststoff inn i blodsirkulasjonen er en mulighet, så ta de samme forholdsregler som hvis kontraststoffet var gitt intravaskulært.

Se også: [4.7 Ekstravasal injeksjon \(Subkutan kontrastinjeksjon\)](#)