

Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til: 23.03.2022/23.03.2023
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.00
Godkjenner: Kristensen, Aina Nærø	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Bente Vee /Maiken K Brix /avdelingsoverlegen	Dok.id: D32775

Gjelder kun når jodkontrast skal brukes

Aktuelle produktnavn med metformin som virkestoff er Glucophage®, Metformin®, Competact®, Janumet® og Eucreas®, Xigduo®, Komboglyze®, Jentaducto® og Synjardy®.

Metformin er kontraindisert ved eGFR <30.

Se også [5.2 eGFR rutiner JOD kontrast / oversikt tiltaksgrenser](#)

Kontrastadministrasjon	eGFR \geq 30	eGFR < 30
Intravenøs	Kan fortsette med metformin som vanlig.	(nyrefunksjonen kan være forbigående lav)
Intraarteriell (både første og andre nyreeksposering)	Kan fortsette med metformin som vanlig.	Seponeres fra tidspunkt for kontrastmiddelinjeksjon. Ny eGFR måling etter 48 timer, start opp igjen bruk av metformin hvis nyrefunksjonen ikke er signifikant endret.

For kilder, se Helse Vests [Retningslinje for intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon](#)