

Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til:04.01.2024/04.01.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.01
Godkjenner: Kristensen, Aina Nærø	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Bente Vee/ Maiken K. Brix/ avdelingsoverlegen	Dok.id: D32784

”Barrierer” før injeksjon

Som en siste ”barriere” før injeksjon kontrollerer /etterspør radiograf relevante opplysninger relatert til kontrastmiddelbruk (og strålevern).

Radiografens sjekkliste:

Jod-kontrast:

- Manifest hyperthyreose
- Diabetes og [bruk av metformin](#) ved lav nyrefunksjon
- Tidligere reagert på kontrastmiddel
- Allergier som krever medikamentell behandling
- Astma
- [eGFR-verdi](#)
- Amming
- [Gravid /mulighet for graviditet](#)

MR-kontrast:

- Tidligere reagert på kontrastmiddel
- Allergier som krever medikamentell behandling
- Astma
- Kjent nyresvikt, eGFR verdi ved hjerte og lever MR-undersøkelse*
- [Gravid /mulighet for graviditet](#)
- Nylig utført eller skal levertransplanteres
- Amming

Konferer med radiolog dersom de fremkomne pasientopplysningene ikke har vært kjent for radiolog ved tidspunktet for henvisningsvurdering.

Dokumenter i henvisningsanmerkning i Sectra. Radiolog dikterer relevante opplysninger i radiologisvaret.

* [2.1.1 Kontrastmiddeltyper ved Radiologisk avdeling](#)