

 <b>HELSE BERGEN</b> Haukeland universitetssjukehus	<h2>6.3 Registrering av kontrastmiddelreaksjoner i Sectra RIS/PACS</h2>	
Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til: 27.01.2020/27.01.2022	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.01	
Godkjenner: Kuvås, Kari Løhre	Retningslinje	
Dok. ansvarlig: Bente Vee/ Maiken K. Brix/ Kari Kuvås	Dok.id: D32786	

Se prosedyre : [Registrering av kontrastmiddelreaksjoner i Sectra, lokal rutinebeskrivelse](#)

### Milde og moderate kontrastmiddelreaksjoner

Pasienter hvor Radiologisk avdeling tidligere har registrert i RISet en reaksjon av mild til moderat art, skal det konfereres med radiolog før ny injeksjon.

Se [4.1 Definisjoner og Klassifikasjon kontrastmiddelreaksjoner](#)

Dersom det ved "dagens" undersøkelse blir valgt å gi kontrast skal man skrive i varslingsfelt, omtalt som "bombe", at denne gangen forløp intervensjonen normalt. Tidligere reaksjoner kan ha sammenheng med dårligere almenntilstand på angitt tidspunkt.

Ved tidligere Alvorlig reaksjon, er bruk av kontrastmidler **kontraindisert**.

Se kapittel [4.2 JOD-kontrast : AKUTTE bivirkninger, risikofaktorer og risikoreduksjon](#)

Se også kapittel [6.2 Kompetanse og ansvar ved legemiddelhåndtering: Ordinering, istandgjøring, dobbeltkontroll, utdeling og dokumentasjon](#)