

Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til: 19.04.2024/19.04.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.04
Godkjenner: Kuvås, Kari Løhre	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Aina N.Kristiansen /Lena SkarphgenT. Storaas (allergologisk avd)	Dok.id: D32788

Hva?	Milde kontrastmiddelreaksjoner		Moderate kontrastmiddelreaksjoner		Alvorlige kontrastmiddelreaksjoner	
	Allergi/overfølsomhet	Kjemotoksiske reaksjoner	Allergi/overfølsomhet	Kjemotoksiske reaksjoner	Allergi/overfølsomhet	Kjemotoksiske reaksjoner
Type symptomer (se Definisjon og klassifisering Kontrastmiddelreaksjoner)	Lett urticaria Lett kløe Hudrødme	Kvalme, milde brekninger Varme/ kuldegysninger Vasovagal reaksjon som går over av seg selv	Kraftig eller langvarig oppkast Tydelig og uttalt urticaria Lette bronko-spasmer Ødem i ansikt og/eller hals	Kraftig oppkast Vasovagalt anfall	Hypotensivt sjokk Hjertestans	Arytmi Kramper
Akuttbehandling	Observasjon, evt antihistamin for å dempe symptomer		Symptomatisk behandling er nødvendig og / eller undersøkelsen blir forsinket eller avbrutt. Pasienten bør etter slike episoder observeres et par timer se Akutt behandling av KM-reaksjoner		Sette adrenalin (EPIpen), ringe stansteam, trekke opp adrenalin i sprøyte. Se Akutt behandling av KM-reaksjoner	
Dokumentasjon	Milde reaksjoner: Lage varsel i Sectra. Obs! Ikke synlig i DIPS. Registrering av kontrastmiddelreaksjoner i Sectra, lokal rutinebeskrivelse Skriv hendelsesforløp og type kontrast. Evnt råd om bytting neste gang. Moderate og alvorlige reaksjoner: Se dokumentere kritisk info DIPS					
Dokumentasjon i radiologisvar	Ja.		Ja		Ja	
Blodprøver* Ansvar	Ingen blodprøver		<p style="text-align: center;">Blodprøver ved mistanke om anafylaktisk reaksjon «Anafylaksi» i DIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> «Anafylaksi» innen 4 t «Anafylaksi» innen 4 t. Barn «Anafylaksi» > 12 timer etter «Anafylaksi» 12 timer etter. Barn <p>Vakthavende LIS / involvert radiolog rekvirerer blodprøver ved mistanke om anafylaktisk reaksjon. Dersom ikke prøven kan bestilles via DIPS, kan blodprøve bestilles ved å fylle ut papirskjema. Prøvetaking «Anafylaksi» innen 4 timer, utføres i Radiologisk avdeling (bioingeniør vakt for prøvetaking tlf 973100), Prøvetakingsenhet i 2. etg Sentralblokk eller inneliggende avdeling.</p> <p>Inneliggende avdeling v/vakthavende lege tar hånd om kontrollprøve «Anafylaksi» > 12 timer etter. For polikliniske pasienter avtales det i hvert enkelt tilfelle hvor dette skal gjøres. Pas vil i de fleste tilfeller legges inn til observasjon.</p> <p>Videre oppfølging og utredning av evt. kontrastmiddelallergi, ivaretas av pasientens fastlege / behandlende lege HUS, i samarbeid med Spesialallergologisk seksjon HUS.</p> <p>Radiograf besørger prøveglass med evt. restkontrast (3-4 ml +), som merkes med pasientens ID og sendes til Spesialallergologisk seksjon HUS, sammen med en kort beskrivelse av hendelsesforløp. For mer informasjon om videre utredning, kontaktes spesialallergologisk seksjon. (Sendes på høring hos spesialallergologisk seksjon april 24 aeav 97-7710)</p>			