

Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 02.03.2021/02.03.2022
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Revmatologisk avdeling	Versjon: 4.01
Godkjenner: Alf Henrik Andreassen	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Merete Valen	Dok.id: D37283

### Vurdere forsiktighetsregler/kontraindikasjoner

Tidligere eller nåværende sykehistorie på malign sykdom eller betydelig genetisk risiko for malign sykdom.

Kjent TBC smitte eller smitte med opportunistiske infeksjoner, inklusiv reiseanamnese.

Økt risiko for hepatitt B infeksjon.

Pågående alvorlig infeksjon eller tidligere økt infeksjonstendens.

Hjertesvikt NYHA kl. III-IV

Alvorlig astma/lungesykdom.

Planlagte større kirurgiske inngrep i nær fremtid.

Graviditet, amming eller planlagt graviditet.

Demyeliniserende sykdom.

Levende vaksine siste 4 uker.

### Forprøver og vaksiner

Det er planlagt forprøver etter skjema:

Pneumokokk vaksine

Influensavaksine i sesong

Hepatitt B, Hepatitt C, HIV ved indikasjon

RTG thorax

Quantiferon/IGRA test

Legen skal bestille undersøkelsene,

[Sykepleier fyller ut sjekkliste](#)

Sykepleier følger opp og kaller pasienten inn til oppstart skriftlig og muntlig informasjon om medikamentet, opplæring i injeksjonsteknikk og oppstart behandling. Pasienten bør da registreres i aktuelle studier og registre.

- Hepatittserologi
- Quantiferon (trenger ikke gjentas ved ny søknad)
- anamnese på tb eksponering - regelmessig
- gammaglobuliner for Mabthera/Benlysta
- Vaksinasjon (pneumokokk, evt influensa)
- Rtg thorax (trenger ikke gjentas ved ny søknad)

Interne referanser

Eksterne referanser