

## Hørsel-undersøkelse av nyfødte

Sosial og Helsedirektoratet har bestemt at alle nyfødte skal hørselundersøkes. Dette for tidlig å oppdage hørseltap slik at hjelpetiltak kan iverksettes så raskt som mulig.

### Hvordan undersøkes barnet?

En liten plugg settes i øret på barnet. I den kommer det en svak knitre-lyd, og så måler man den lyden som kommer tilbake fra indre øre. Det er lyd vi måler, så barnet må være rolig og det må være stille i rommet. Sover barnet, er det ekstra bra.

Hvis denne testen ikke går, klistrer man 3 ledninger på hodet og måler hjerneaktiviteten (EEG) med samme lydstimulering.

Dersom resultatene ikke er tilfredsstillende, skyldes dette oftest at barnet fortsatt har fostervann i mellomøret. Da blir barnet innkalt til Høresentralen i løpet av noen uker for gjentatte tester.

Vi regner med at ca 5 % av barna må testes på nytt, men bare 1-2 av 1000 nyfødte har virkelig behandlings-trengende hørseltap ved fødselen.

Noen barn får svekket hørsel i årene etter fødselen. Det er derfor viktig at foreldrene observerer barnets utvikling og følger kontrollene ved Helsestasjonen.

## Hørsel-undersøkelse av nyfødte

Sosial og Helsedirektoratet har bestemt at alle nyfødte skal hørselundersøkes. Dette for tidlig å oppdage hørseltap slik at hjelpetiltak kan iverksettes så raskt som mulig.

### Hvordan undersøkes barnet?

En liten plugg settes i øret på barnet. I den kommer det en svak knitre-lyd, og så måler man den lyden som kommer tilbake fra indre øre. Det er lyd vi måler, så barnet må være rolig og det må være stille i rommet. Sover barnet, er det ekstra bra.

Hvis denne testen ikke går, klistrer man 3 ledninger på hodet og måler hjerneaktiviteten (EEG) med samme lydstimulering.

Dersom resultatene ikke er tilfredsstillende, skyldes dette oftest at barnet fortsatt har fostervann i mellomøret. Da blir barnet innkalt til Høresentralen i løpet av noen uker for gjentatte tester.

Vi regner med at ca 5 % av barna må testes på nytt, men bare 1-2 av 1000 nyfødte har virkelig behandlings-trengende hørseltap ved fødselen.

Noen barn får svekket hørsel i årene etter fødselen. Det er derfor viktig at foreldrene observerer barnets utvikling og følger kontrollene ved Helsestasjonen.