

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h1>Cystografi</h1>	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 15.03.2022/15.03.2024	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.03	
Godkjenner: Bolstad, Guri Margrete	Prosedyre	
Dok. ansvarlig: Line Nigardsøy Lie / Guttorm Jenssen	Dok.id: D45984	

Indikasjon

- Postoperativt etter radikal prostatektomi (for å se etter lekkasje i anastomosen mellom blære og urethra).
- Blæredivertikkel.
- Blærefistler.
- Posttraumatisk.

Kontraindikasjoner

- Ingen.

Pasientforberedelser ved røntgenlab.

- Informere pasienten
- Finne frem utstyr
- Klargjøre kontrast
- Kontrast settes i blærekateter

Utstyr og kontrast

- Katetersett (vaskesett)
- 50 ml sprøyte m/cat. tip
- Steril bolle
- Urinpose
- Sterilt vann (til vasking)
- Sterile hansker
- Korntang
- Omnipaque 140 mgI/ml (200 ml) → 2-3 flasker
- Treveiskran
- Intravenøsstativ / i.v sett

Pasientleie

- Ryngleie.

Eksponeringsparametere

- Program: «ERCP»

Metode

1. Ta 2 oversiktsbilder uten kontrast-FRONT og RETT SIDE.
2. Vask og sett inn kontrast, min60-70ml, inntil pasienten angir ubehag.
3. Hold kateteret avstengt og sett på en ny urinpose.
4. Følgende bilder kan tas av blæren:
 - FRONT
 - SIDE
 - TO SKRÅ, 45 GRADER
5. Husk å åpne kateteret etter undersøkelsen.

