

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2 style="margin: 0;">Myelografi cervicalcolumna</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 14.04.2023/14.04.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.06
Godkjenner: Bolstad, Guri Margrete	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Line Nigardsøy Lie / Jostein Kråkenes	Dok.id: D46030

Relaterte prosedyrer: [CT cisternografi](#)

NB! Etter undersøkelse skal pasient direkte til CT, for undersøkelse. Sjekk at CT lab er informert.

Indikasjon

- Smerter som utgår fra nakke

Pasienten skal på forhånd være vurdert av nevrolog eller nevrokirurg, og funnet operasjonstrengende.

Kontraindikasjoner

- Hvis pas bruker blodtynnende medikamenter: se [seponeringsregime](#) ved myelografi.

Forberedelse før undersøkelse

- Pasienten skal alltid være innlagt
- Pasienten må ikke spise frokost undersøkelsesdagen.
- Drikke rikelig (vann, melk, te eller kaffe).
- Smertestillende dersom pasient har mye vondt.

Forberedelse på røntgenlab

- Informere pasienten, også om forhold [etter undersøkelse*](#)
- Barbere pasienten bak øret på venstre side.
- Øret tapes fremover (nålen går inn like bak øret)
- Finne frem utstyr /dekke opp

Innstilling av pasient for undersøkelse

- Bukleie.
- Hodet skal være ekstendert med spesialpute under haken.

Utstyr /Kontrast

Steril oppdekking:

- 2 Sterile håndklær
- Vaskesett
- Svart spinalnål – 0,7 mm
- 5 ml sprøyte
- 10 ml sprøyte
- Grønn sprøytespiss
- Opptrekkskanyle
- Mellomstykke (tynt og mykt)

Ha klart:

- Lidokain
- Blybokstaver (H+V)
- Omnipaque 240 mg I/ml, 20 ml.

Eksponeringsparametere:

- ERCP-program
- Bruk kiler ved behov

Metode

- Pasienten ligger i buklee for punksjon.
- Bordet heves med hodeenden ca. 15 grader før punksjon.
- Etter kontrastinjeksjon utføres aktuell billedtagning av nevreradiolog.
- NB! Husk merking av høyre/venstre.
- For å få minst mulig lekkasje av spinalvæske gjennom innstikkstedet benyttes så tynn nål som mulig: Svart lumbalnål 22 G (0,7 m.m. diameter).

***) Etter undersøkelsen:**

Pasienten skal til CT-undersøkelse umiddelbart etterpå, for å utnytte kontrasten.

Pasienten er innlagt på nevrokirurgen eller nevrologisk post. Pasienten skal ligge mest mulig flatt i sengen men med pute under hodet. Vi ønsker ikke at kontrasten skal komme opp i hodet, men for spinalpunksjonens del bør pasienten ligge mest mulig flatt. Dette kan være med å minske den hodepinen som mange av disse pasientene har vært plaget med etter myelografi.

