

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Retrograd pyelografi</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 29.10.2021/29.10.2023
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.01
Godkjenner: Bolstad, Guri Margrete	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Line Nigardsøy Lie / Guttorm Jenssen	Dok.id: D46043

Retrograd = mot strømmen

Indikasjoner

- Mangelfull framstilling av samlesystemet eller ureter ved urografi.
- Nærmere evaluering av fylningsdefekter i samlesystemet oppdaget ved urografi.
- Framstilling av ureterfistel.
- Undersøkelse av samlesystemet hos pasienter som ikke kan få intravenøst kontrastmiddel.

Kontraindikasjoner

Kontrastmiddelallergi er en relativ kontraindikasjon. Allergisk reaksjon er svært sjelden ved denne prosedyre.

Forberedelse før undersøkelse

- Pasienten får innlagt kateter i nyrebekkenet via blæren på SOP, før de kommer til røntgen.

MERK: Pasienten skal ikke ligge med dette kateteret lenger enn 4 timer, slik at undersøkelsen må skje innenfor dette tidsvinduet.

Forberedelse ved røntgenlab.

- Informere pasienten
- Finne frem utstyr

Utstyr /Kontrast

- Grønn/gul nål
- Piang
- 50 ml sprøyte
- Opptrekkskanyle

- Omnipaque 140 I/ml

Innstilling av pasient for undersøkelse

- Ryngleie.

Eksponeringsparametere

- Teknikk: ERCP

Metode

- Oversiktsbilder av hele ureter.
- Kontrastinjeksjon under gjennomlysning.
- Følgende bilder kan taes:
 - FRONT OG SKRÅ av nyrebekken og øvre ureter
 - SKRÅBILDER av nedre ureter
 - FRONT av hele ureter under uttrekking av kateteret og samtidig kontrastinjeksjon.

MERK! Blærekateter skal fjernes dersom annet ikke er angitt på henvisning. Konferer rekvirent ved tvil.