

 HELSE BERGEN <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Øsofagus v/ fremmedlegeme</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 29.06.2023/29.12.2024
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.02
Godkjenner: Bolstad, Guri Margrete	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Line Nigardsøy Lie / Cornelia Rösler	Dok.id: D46250

Indikasjoner

- Spørsmål om fremmedlegeme

Andre typer øsofagusundersøkelser, se:

- [Øsofagus, utredning og kartlegging](#)
- [Øsofagus preoperativ achalasi-undersøkelse](#)
- [Øsofagus postoperativ achalasi-undersøkelse](#)
- [Øsofagus, Cleveland protokoll](#)
- [Øsofagus, svelgstudie](#)
- [Øsofagus, spørsmål om perforasjon /fistel](#)

Forberedelse før undersøkelse

- Ingen

Forberedelser

- Informere pasienten
- Finne frem utstyr

Utstyr/Kontrast

- Bomullsdott (druestørrelse i tørr tilstand)
- Plastkrus
- Skje
- Pussbekken
- Cellestoff

KONTRAST

- Vannløselig kontrast, minimum styrke 350 mg J/ml (Iomeron, Omnipaque)
Gastrografin skal ikke brukes.

Innstilling av pasient før undersøkelse

- Stående eller sittende.

Eksponeringsparametere

- Organprogram: «Øsofagus». 7,5 p/s

Metode

1. Tombilder: Front og side hals, front og side øsofagus.
2. Kontrastserier
 - **Ved stort fremmedlegeme** (for eksempel kjøttbit): pasienten drikker en slurk kontrast i front og sideplan under gjennomlysning.
 - **Ved mindre fremmedlegemer** (for eksempel fiskebein): pasienten svelger bomullsdott dyppet i kontrast under gjennomlysning. Dersom bomullsdott blir sittende fast, dokumenteres nivået i flere plan. Dersom bomullsdotten ikke henger fast, tas slimhinnebilder av hele øsofagus med pasienten skrådd begge veier (45 grader)

Gi minst mulig kontrast ettersom pasienten kanskje skal i narkose etterpå.