

 HELSE BERGEN <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Øsofagus, preoperativ achalasiundersøkelse</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 29.10.2021/29.10.2023
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.01
Godkjenner: Bolstad, Guri Margrete	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Line Nigardsøy Lie / Cornelia Røsler	Dok.id: D46251

Indikasjoner

- Pasienter som har kjent achalasi (innsnevring /spasmer av øsofagus) og som skal til POEM= Per Oral Endoskopisk Myotomi (sirkulær muskel i øsofagus kuttes i for å få bedre åpning)

Andre typer øsofagusundersøkelser, se:

- [Øsofagus, utrednings og kartlegging](#)
- [Øsofagus v/fremmedlegeme](#)
- [Øsofagus postoperativ achalasi-undersøkelse](#)
- [Øsofagus, Cleveland protokoll](#)
- [Øsofagus, svelgstudie](#)
- [Øsofagus, spørsmål om perforasjon /fistel](#)
-

Forberedelse før undersøkelse

- Ingen

Forberedelser på røntgenlab

- Informere pasienten
- Finne frem utstyr
- Blande kontrast
- Fest linjal på pasient, ved siden av øsofagus (front, høyre side)

Utstyr/Kontrast

- Plastkrus x 2 (1 til vann)
- Linjal
- Pussbekken
- Cellestoff

KONTRAST

- E-Z-HD som blandes med 65 ml vann og ristes før bruk.

MERK!

Gastrografin skal ikke brukes.

Innstilling av pasient før undersøkelse

- Stående evt. sittende.

Eksponeringsparametere

- Overbordsrør.
- Teknikk: ERCP- program. Gjennomlysning 7,5 pr sek

Metode:

Sjekk at linjal er plassert korrekt på pasient

1. Front MED linjal (linjal for å finne snitthøyde og snittlengde)
2. Skrå til venstre MED linjal.
3. Skrå til høyre MED linjal. OBS! Ha med hele fundus.
4. Side UTEN linjal

