

 Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus	5.13 SVK (sentralt venekateter) og kontrastinjeksjon ved CT-undersøkelser	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 13.01.2022/13.01.2024	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.00	
Godkjenner: Kristensen, Aina Nærø	Prosedyre	
Dok. ansvarlig: Bente Vee / Trond Bergesen	Dok.id: D46281	

Omfang

Gjelder for pasienter hvor det er vanskelig å få venøs tilgang via en PVK (perifer venekanyle) og hvor det vurderes bruk av SVK for jodkontrastinjeksjon.

Jodkontrast vil da bli injisert med trykksprøyte (auto kontrastinjektor)

Beskrivelse:

Rutiner vedrørende bruk av SVK (sentralt venekateter) for nevnte formål er nedfelt i en regional retningslinje for Helse Vest:

[Retningslinje for bruk av SVK, VAP, MID-line og PICC-line ved kontrastmiddeladministrering under trykk på CT](#)

Se oversiktstabell: [Oversikt over trykkompatible katetre til bruk på CT](#)