

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Øsofagus, spørsmål om perforasjon / fistel</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 29.10.2021/29.10.2023
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 2.03
Godkjenner: Bolstad, Guri Margrete	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Line Nigardsøy Lie /Cornelia Røsler	Dok.id: D46588

NCRP kode: RG Øsofagus

NCRP tilleggskode: peroral kontrast

Indikasjoner

- Postoperativ lekkasje

Andre typer øsofagusundersøkelser, se:

- [Øsofagus, utredning og kartlegging](#)
- [Øsofagus v/fremmedlegeme](#)
- [Øsofagus preoperativ achalasi-undersøkelse](#)
- [Øsofagus postoperativ achalasi-undersøkelse](#)
- [Øsofagus, Cleveland protokoll](#)
- [Øsofagus, Svelgstudie](#)

Forberedelse før undersøkelse

- Ingen

Forberedelser

- Informere pasienten
- Finne frem utstyr /kontrast

Utstyr/Kontrast

- Plastkrus x 2 (ett med kontrast og ett med vann)
- Pussbekken
- Cellestoff
- Vannløselig kontrast, minimum 300 mg I /ml eller sterkere (Iomeron 400 eller Omnipaque 350)
Gastrografin og barium skal ikke brukes.

Metode

- Pasienten står eller sitter på fotbrett
- Underbordsrør foretrekkes av strålevernshensyn
- Teknikk: øsofagus organprogram. Gjennomlysning 7,5 p/sek
- Bruk kiler ved behov

Billedokumentasjon:

1. Tombilde, front
2. Gjennomlysningsserie: start med side øvre svelg og side øsofagus med kontrast
3. Gjennomlysningsserie: front øsofagus med kontrast
4. Gjennomlysningsserie: skrå mot venstre og høyre (hele øsofagus eller aktuelt område ved kontrollundersøkelse).