

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Ervervet hjerneskade - Fase 3 Nevropsykolog Barne- og ungdomsklinikken	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 15.09.2026/15.09.2027	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Barne- og ungdomsklinikken/HABU	Versjon: 2.00	
Godkjenner: Berge, Pernille Schaathun	Retningslinje	
Dok. ansvarlig: Berge, Pernille Schaathun	Dok.id: D65824	

Nevropsykologens arbeidsoppgaver, Fase 3, Ervervet hjerneskade

Delta på tverrfaglig teammøte (1 gang i uken fast tidspunkt) - koordineres av kontaktlege/koordinator

- Fremdeles vurdere skjermingsbehov og aktivitetsnivå/hvile
- Kartlegging av premorbid funksjonsnivå, anamnese (hvis ikke allerede gjort i fase 1-2)
- Kontakt med lokal skole, bhg, PPT (hvis ikke allerede gjort i fase 1-2)
- Kartlegging av kognitiv funksjon, inkludert orientering, hukommelse, obs. sensorisk overfølsomhet
- Nevropsykologisk testing
- Kartlegging av ressursar, funksjonar som er intakte
- Kartlegging av psykososial funksjon, inkl. sosialt nettverk
- Psykoedukasjon ifht. hjerneskade, inkludert emosjonelle endringer etter hjerneskade (også relevant i fase 1 og 2)
- Kognitiv trening: verktøy og kompetansebygging
- Møte med lokale instanser
- Anbefale tiltak/tilrettelegging lokalt

Kartleggingsverktøy

Bevissthetsnivå: Glasgow Coma Scale/Coma Recovery Scale, GOAT, CAP,

Orientering:

Vurdering av skjermingsbehov:

Anamnese

Kartlegging av kognitive funksjoner: WPPSI-IV, WISC-V, WAIS

Nevropsykologisk undersøkelse: D-REF, D-KEFS, NEPSY, CAVLT-II, WMS, CPT, Halstead-Reitan testbatteri

Eksekutive funksjoner: BRIEF2

Livskvalitet: PedsQL

Sosial fungering: Anamnese, SDQ, 5-15,