

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Oversikt over barneprotokoller på CT - Traume</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Radiologi	Gyldig fra/til: 21.12.2023/21.12.2024
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 1.00
Godkjenner: Fjell, Else-Gunn Bøe	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Trond Bergesen	Dok.id: D77553

Oversikt over barneprotokoller på CT - thorax

BM-01 Multitraume hode, ansikt, cervicalcolumna [20.3.2.1.5-02](#)

Indikasjon:

Traume

Forberedelse:

Antall serier: 2 (3)

Kontrast: NEI

Serier:

1. Caput
2. Ansikt
3. Ansikt og cervicalcolumna

BM-02 Multitraume helkropp barn [20.3.2.1.5-03](#)

Indikasjon:

traume

Forberedelse: pvk,

Antall serier: 4

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s

Serier:

1. Caput uten ivk
2. Ansikt/cervical columna uten ivk.
3. Kontrastinjeksjonstid + 15s. Gjennom hele thorax
4. Kontrastinjeksjonstid + 40s. fra diafragma til gjennom bekkenet

BM-03 Multitraume helkropp blødningsprotokoll barn [20.3.2.1.5-04](#)

Indikasjon:

Traume med høy sannsynlighet for pågående blødning som kan trenge intervensjon. Klinisk hemodynamisk ustabil/påvirket pasient

Forberedelse: pvk,

Antall serier: 5

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s

Serier:

1. Caput uten ivk
2. Ansikt/cervical columna uten ivk.
3. Bolustracking: CTA Thorax, abdomen og bekken
4. Kontrastinjeksjonstid + 40s. fra diafragma til gjennom bekkenet
5. 5 min. Lavdose urinveier

BM-04 Multitraume helkropp med halskar barn [20.3.2.1.5-05](#)**Indikasjon:**

Traume std. utredning, med angiografi av halskar i tillegg. Strangulasjon, mistanke om disseksjon/skade på halskar.

Forberedelse: pvk,

Antall serier: 4

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2 ml/kg, flow etter pvk ca 1-4ml/s

Serier:

1. Caput uten ivk
2. Bolustracking: CTA halskar til gjennom Willis ring.
3. 30s. Gjennom hele thorax.
4. Kontrastinjeksjonstid + 40s. fra diafragma til gjennom bekkenet
5. 5 min. Urinveier