

 HELSE BERGEN <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Sjekkliste for Hjerne CT, Interne og HDS</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 15.10.2024/15.09.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Hjerneavdelingen	Versjon: 6.00
Godkjenner: Krohn, Isabel Lechner	Skjema
Dok. ansvarlig: Isabel Krohn	Dok.id: D42335

Intern HUS/HDS henvisning til CT Hjerne som inneliggende pasient

Legen må skrive forespørsel om organundersøkelse i DIPS – helst før kl. 10.00.
 Det er avsatt tid til ØH/inneliggende fra ca kl 10.00-11.30 og ca kl 13.30-15.00.

Om det haster, kontakt CT-ansvarlig lege!

Tlf. 972162 – Ole Chr. Lekven og Eva Pedersen

Tlf. 972164 – Iman Karaji

Tlf. 976736 – Abukar Ali

Tlf. 976755 – Christ Berge

Radiografene ringer avdelingen med nærmere beskjed om time eller andre instruksjoner.

Det er ønskelig med puls rundt 60 for optimal bildekvalitet - derfor skal pasienten ikke drikke kaffe/te siste to timene før undersøkelsen!

Pasienten får betablokker iv (Metopocor 1mg/ml) ved puls høyere enn 65 og Nitrolingualspray 0,4mg/dose dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner.

Pasienten får kontrastmiddel iv (Omnipaque 350 mg/ml).

Ved andre undersøkelsesrelaterte spørsmål, ring 972210.

Sjekkliste	Utført:
<p>Om aktuelt: Pasienter som har tidligere <u>kjent kontrastreaksjon</u> må forbehandles etter prosedyre kvelden før og samme morgen som undersøkelsen. Kontakt radiograf på 972210 for mer informasjon.</p>	
<p>Pasienten trenger en grønn PVK i albuevene, likegyldig om det er høyre eller venstre. OBS! Bypass-opererte pasienter bør ha veneflon i <u>høyre albuevene!</u></p>	
<p>Ikke koffeinholdig drikke (kaffe/te) siste 2 timer før undersøkelsen.</p>	
<p>Sjekk siste blodprøvesvar. GFR skal være over 30. Blodprøver (GFR og Kreatinin) bør ikke være eldre enn 7 dager gamle. Merk: Ved moderat redusert nyrefunksjon (GFR mellom 30 - 50) kan det vurderes oppvæsking før undersøkelse (500ml NaCl).</p>	

Pas med Diabetes II:

Diabetesmedikamentene Metformin, Glucophage, Competact, Eucreas, Janumet, Jentaduetto eller Komboglyze kan tas som normalt. **Merk!** Disse skal kun seponeres dersom pasienten har GFR under 30.

Eksterne sykehus: [Sjekkliste for Hjerne CT, Eksterne sykehus](#)