

Smertelindring etter fjerning av mandler, barn 17-25 kg

Vi bruker en kombinasjon av paracetamol og ibuprofen for smertelindring av barn etter fjerning av mandler og falske mandler. Det er ikke viktig om legemidlene gis som mikstur, smeltetabletter, tabletter eller stikkpiller – dette avhenger av hva som er lettest å få i barnet. Det kan være lurt å gi barnet mat og drikke en times tid etter at smertestillende er gitt, ettersom den smertelindrende effekten da er på sitt beste.

Paracetamol + ibuprofen tas fast i 4-5 dager, deretter ved behov, men aldri mer per dag enn det som ble brukt ved fast dosering. Mange opplever en smertetopp dag 4-5.

Ditt barn veier _____ kg og skal ha følgende doser av paracetamol og ibuprofen:

Paracetamol: Paracet stikkpiller 250 + 60 mg hver 6. time **ELLER** Paracet mikstur 24 mg/ml: 14 ml
hver 6. time

Ibuprofen: Nurofen stikkpiller 125 mg hver 6. time **ELLER** Nurofen mikstur 40 mg/ml: 3,25 ml hver 6. time

OBS: Barnet skal ha BÅDE paracetamol OG ibuprofen. Ikke vekk barnet for å gi smertestillende.

Legemidler som inneholder bare paracetamol: Paracet, Pamol, Pinex, Panodil, Paramax (OBS: Finnes i forskjellige styrker, dosen må tilpasses barnets vekt!)

Legemidler som inneholder bare ibuprofen: Ibux, Nurofen, Ibumetin, Ibumax (OBS: Finnes i forskjellige styrker, dosen må tilpasses barnets vekt!)

