

Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 25.09.2025/25.09.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Hjerteklinikken	Versjon: 8.00
Godkjenner: Spjelkavik, Camilla	Skjema
Dok. ansvarlig: Isabel Krohn	Dok.id: D50929

<b>Eksterne sykehus: henvisning til CT Hjerter (ØH/CT Hjerter som inneliggende)</b>	
	Utført
<p>Legen må skrive en henvisning til CT Hjerter i DIPS, eventuelt faxe henvisning til 55976184. Ring i såfall inn personalia til driftskontor tlf 55972145.</p> <p><b>Ved spørsmål kan CT-ansvarlige leger kontaktes:</b></p> <p style="margin-left: 20px;"> <b>Tlf. 55976755 – Christ Berge</b>  <b>Tlf. 55972162 – Ole Chr. Lekven / Eva R. Pedersen</b>  <b>Tlf. 55972164 – Iman Karaji</b>  <b>Tlf. 55976736 – Abukar Ali</b>  <b>Tlf. 55972178 – Terje Larsen</b> </p> <p>Pasienter til CT Hjerter <u>må</u> være avtalt på forhånd. Hjerterintervensjon tar derfor kontakt og avtaler overflytting. Pasienter til CT Hjerter sendes og tas imot som pasienter til hjertekateterisering (overflyttere). De skal tas imot i Akuttmodtak ved ankomst Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Henvisende lege (på lokalsykehus) avgjør hvilken transportform som er nødvendig <u>til</u> HUS.</p> <p><b>Presisering ang. retur til lokalsykehus/hjem:</b> Pasienten blir skrevet ut fra HUS dersom undersøkelse ikke indikerer at pasienten trenger innleggelse. Retur til hjemmet skjer for pasientens egen regning dersom pasienten ikke kan ta Helseekspressen. <b>Det er derfor viktig at pasienten har privat tøy, egnede sko, lommebok og telefon med seg.</b></p> <p>Det er ønskelig med puls rundt 60 for optimal bildekvalitet - derfor skal pasienten ikke drikke kaffe/te minst to timer før undersøkelsen!          Dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner får pasienten betablokker iv (Metopocor 1mg/ml) ved puls høyere enn 65 og Nitrolingualspray 0,4mg/dose.          Pasienten får kontrastmiddel iv (Omnipaque 350 mg/ml).</p> <p><b>Ved andre undersøkelsesrelaterte spørsmål, ring 55972210 for å snakke med radiograf på lab.</b></p>	
<b>Forberedelser:</b>	Utført
<p>Pasienter som har kjent kontrastreaksjon fra tidligere må forbehandles etter prosedyre kvelden før og samme morgen som undersøkelsen!          Se rutine i EK: <b><u>Forbehandling ved allergi/mulighet for kontrastreaksjon</u></b></p> <p>Pasienten trenger en grønn PVK i albuvene, likegyldig om det er høyre eller venstre.  <b>OBS! Bypass-opererte pasienter bør ha veneflon i høyre albuvene!</b></p> <p>Ikke koffeinholdig drikke (kaffe/te) siste 2 timer før undersøkelsen.</p> <p>Sjekk siste blodprøvesvar. <b>GFR skal være over 30.</b> GFR og Kreatinin bør ikke være eldre enn 7 dager gamle. Diabetesmedikamentene Metformin, Glucophage, Competact, Eucreas, Janumet, Jentaduo eller Komboglyze kan tas som normalt. <b><u>Disse skal kun seponeres dersom pasienten har GFR under 30.</u></b></p>	