

Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 22.08.2024/22.08.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Hjerteavdelingen	Versjon: 7.00
Godkjenner: Vikenes, Kjell	Skjema
Dok. ansvarlig: Isabel Krohn	Dok.id: D50929

Eksterne sykehus: henvisning til CT Hjerte (ØH/CT Hjerte som inneliggende)	
	Utført
<p>Legen må skrive en henvisning til CT Hjerte i DIPS, eventuelt faxe henvisning til 55976184. Ring i såfall inn personalia til driftskontor tlf 55972145.</p> <p>Ved spørsmål kan CT-ansvarlige leger kontaktes:</p> <p style="margin-left: 20px;">Tlf. 55976755 – Christ Berge Tlf. 55972162 – Ole Chr. Lekven / Eva R. Pedersen Tlf. 55972164 – Iman Karaji Tlf. 55976736 – Abukar Ali (permisjon til feb. 2025)</p>	
<p>Pasienter til CT Hjerte <u>må</u> være avtalt på forhånd. Hjerteintervensjon tar derfor kontakt og avtaler overflytting. Pasienter til CT Hjerte sendes og tas imot som pasienter til hjertekateterisering (overflyttere). De skal taes i mot i Akuttmotak ved ankomst Haukeland. Henvisende lege (på lokalsykehus) avgjør hvilken transportform som er nødvendig (Helseekspress, evt ambulanse). Pasienten blir meldt på post og har rett på sengeplass om retur samme dag ikke er mulig.</p> <p>OBS: Unntak gjelder for pasienter fra Haraldsplass DS. Se egen rutine i EK (<u>Interne/HDS henvisning til CT Hjerte</u>)</p> <p>Det er ønskelig med puls rundt 60 for optimal bildekvalitet - derfor skal pasienten ikke drikke kaffe/te minst to timer før undersøkelsen!</p> <p>Dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner får pasienten betablokker iv (Metopocor 1mg/ml) ved puls høyere enn 65 og Nitrolingualspray 0,4mg/dose.</p> <p>Pasienten får kontrastmiddel iv (Omnipaque 350 mg/ml).</p> <p>Ved andre undersøkelsesrelaterte spørsmål, ring 55972210 for å snakke med radiograf på lab.</p>	
Forberedelser:	Utført
<p>Pasienter som har kjent kontrastreaksjon fra tidligere må forbehandles etter prosedyre kvelden før og samme morgen som undersøkelsen!</p> <p>Se rutine i EK: <u>Forbehandling ved allergi/mulighet for kontrastreaksjon</u></p>	
<p>Pasienten trenger en grønn PVK i albuvene, likegyldig om det er høyre eller venstre.</p> <p>OBS! Bypass-opererte pasienter bør ha veneflon i høyre albuvene!</p>	
<p>Ikke koffeinholdig drikke (kaffe/te) siste 2 timer før undersøkelsen.</p>	
<p>Sjekk siste blodprøvesvar. GFR skal være over 30. GFR og Kreatinin bør ikke være eldre enn 7 dager gamle.</p> <p>Diabetesmedikamentene Metformin, Glucophage, Competact, Eucreas, Janumet, Jentadueto eller Komboglyze kan tas som normalt. <u>Disse skal kun seponeres dersom pasienten har GFR under 30.</u></p>	