

Blandetabell legemidler til parenteral bruk for voksne

Kategori: Pasientbehandling/Legemidler/Fagspesifikke retningslinjer	Gyldig fra/til: 02.04.2025/02.04.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 10.00
Godkjenner: Bjånes, Tormod Karlsen - legemiddelkomiteen	Skjema
Dok. ansvarlig: Legemiddelkomiteen	Dok.id: D60322

Blandetabellen gjelder kun utblanding av legemidler til voksne, og forutsetter bruk av [Aseptisk arbeidsteknikk ved tilberedning av legemidler](#).

Dersom det ikke er oppgitt et eksakt blandevolum/konsentrasjon ved utblanding kan legemiddelet blandes i valgfri mengde væske.

For informasjon om utblanding av legemidler til barn vises det til blandetabell for BUK ([nyfødt](#)) og [blandekort](#) utarbeidet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
AFIPRAN (metoklopramid) 5 mg/ml inj.væske 2 ml amp	IV injeksjon: over minst 3 min Kan også gis IM	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
ALDACTONE (kaliumkanrenoat) 200 mg/10 ml (20 mg/ml) inj.væske 10 ml amp <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: over 2-3 min (1 amp = 10 ml)	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	2,3,4
	IV infusjon: over 30 min	200 mg (1 amp) fortynnes i 250 ml NaCl 9 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
AMIODARON (cordarone) 50 mg/ml inj/inf konsentrat 3 ml amp	IV infusjon: Se Cordaroneinfusjon (amiodarone)	NB! Må fortynnes i glukose 50 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes Etter fortynning: 24 timer RT	1,3,4,8
ASPIRIN (acetylsalisylsyre) 500 mg injeksjons/infusjons-substans, hetteglass. Det medfølger 5 ml sterilt vann til utblanding for hvert hetteglass. <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: Over 3-5 minutter Rask administrasjon kan gi smerte på injeksjonsstedet og/eller tromboflebitt.	IV injeksjon: Tilsett tilhørende 5 ml sterilt vann til 500 mg tørrstoff. Ristes til tørrstoffet er fullstendig oppløst.	2 t i RT	2, 3
	IV infusjon: Over 20 minutter	IV infusjon Tilsett tilhørende 5 ml sterilt vann til 500 mg tørrstoff. Ristes til tørrstoffet er fullstendig oppløst. Tilsettes 100-250 ml NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml.		

Blandetabell legemidler til parenteral bruk for voksne

Versjon:
10.00

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
BEVITINE (tiamin) 100 mg/2 ml (=50 mg/ml) inj.væske 2 ml amp	IV injeksjon: Dose inntil 200 mg over minst 10 min Kan også gis IM	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,7
	IV infusjon: over 30-60 min	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
BURINEX (bumetanid) 0,5 mg/ml inj. væske 4 ml amp	IV injeksjon: Over 1-2 min Kan også gis IM	IV injeksjon: Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,5
	IV infusjon: Over minst 30 min Maksimal konsentrasjon ved fortynning: 0,1 mg/ml	IV infusjon: Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 12 timer RT (1)	
BUSCOPAN Se Skopolaminbutylbromid Kalceks				
CALOKET (ketorolak) 30 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IV injeksjon: over minst 15 sek Kan også gis IM	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3
CATAPRESAN (klonidin) 150 microgram/ml inj.væske 1 ml amp <i>Uregistrert preparat</i>	IV inj/infusjon: over 10-15 min	Ufortynnet eller fortynnet til et praktisk volum i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes Etter fortynning: I NaCl 9 mg/ml: 24 timer i RT I glukose 50 mg/ml: 8 timer i RT	2,3,4,5
CORDARONE Se amiodaron				
CYCLIZINE (=VALOID) (syklizin/cyclizin) 50 mg/ml inj.væske 1ml amp <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: over 3-5 min Kan også gis IM og SC	Ufortynnet eller fortynnet til et praktisk volum i glukose 50 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes	2,3,4
CYCLOKAPRON Se Pilexam				

Blandetabell legemidler til parenteral bruk for voksne

Versjon:
10.00

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
DEXAMETHASONE HAMELN (inneholder propylenglykol) DEXAVIT (deksametason) 4 mg/ml inj.væske 1 ml og 2 ml amp	IV injeksjon: over 2-3 min Kan også gis IM Dexamethasone hameln er også godkjent for SC bruk	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: over 15-30 min	Fortynnes i glukose 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
DEXCLORFENIRAMIN ACCORD (deksklorfeniramin) 5 mg/ml 1 ml amp <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: over minst 1 min Kan også gis IM og SC	Ufortynnet eller fortynnes i NaCl 9 mg/ml Anbefalt konsentrasjon: 1 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes Etter fortynning: bør ikke oppbevares	2,5
DRIDOL (droperidol) 2,5 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IV injeksjon	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes Etter fortynning: 24 timer RT	1
FERINJEKT (jern(III)karboksymaltose) 50 mg/ml inf/inj.væske 2 ml, 10 ml og 20 ml hettegl	Se Ferinject - adm. av jerninfusjon IV injeksjon: Doser ≤ 500 mg gis over minst 5 min Maksimal enkeltdose: 15 mg jern/kg kroppsvekt, men 1000 mg jern må ikke overskrides	Ufortynnet	Anbrutt hetteglass: 12 timer RT 24 timer K	1,4,5,9
	IV infusjon: Doser > 500 mg gis over minst 15 min Maksimal enkeltdose: 20 mg jern/kg kroppsvekt, men 1000 mg jern må ikke overskrides	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml Minimums- konsentrasjon: 2 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
FLUMAZENIL (flumazenil) 0,1 mg/ml inj.væske 5 ml amp	IV injeksjon: Initialdosen 0,2 mg gis over 15 sek. Hvis bevissthetsgraden ikke er nådd innen 60 sek, kan det administreres en andre dose på 0,1 mg. Kan gjentas med 60 sek mellomrom, opp til total dose på 1,0 mg.	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: Infusjonshastighet: 100-400 mikrogram/time	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	

Blandetabell legemidler til parenteral bruk for voksne

Versjon:
10.00

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
FURIX (furosemid) 10 mg/ml inj.væske 2 ml og 25 amp	IV injeksjon: maks hastighet 4 mg/min, dvs 20 mg/5 min Doser over 20 mg bør gis som IV infusjon Kan også gis IM	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: maks hastighet 4 mg/min	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
HALDOL (haloperidol) 5 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IM injeksjon	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
HALDOL DEPOT (haloperidol) 100 mg/ml inj.væske 1 ml amp	Dyp IM injeksjon	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
IVEMEND (aprepitant) 150 mg inf. substans hettegl	IV infusjon: Over 20-30 min	Rekonstituering: Injiser 5 ml NaCl 9 mg/ml i hetteglasset Fortynning: Trek opp hele volumet i hetteglasset og overfør til 145 ml NaCl 9 mg/ml (totalvolum 150 ml) Sluttkonsentrasjon: 1 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	1,4
KETALAR Se Ketamin				
KETAMIN (ketamin) 10 mg/ml inj.væske 20 ml amp 50 mg/ml, inj.væske 5 ml amp	IV injeksjon: over minst 1 min Kan også gis IM (bruk helst 50 mg/ml)	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon etter legens ordinasjon	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	

Blandetabell legemidler til parenteral bruk for voksne

Versjon:
10.00

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
KETORAX (ketobemidon) 5 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IV injeksjon: over minst 3-5 minutt Kan også gis IM og SC	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,4,5
	IV infusjon: etter legens ordinasjon	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
KONAKION (vitamin K) 10 mg/ml inj.væske 0,2 ml amp	IV injeksjon over minst 30 sek Kan også gis oralt	Ufortynnet eller fortynnet i glukose 50 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes.	1
		Sluttkonsentrasjon: 1-2 mg/ml	Etter fortynning: 3 timer RT	
L-THYROXINE SERB (levotyrosin) 200 mikrogram/ml = 0,2 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IV injeksjon: over 2-3 min Maks 100 mikrog/min Kan også gis IM	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	2
	IV infusjon	Fortynnes i 250 ml NaCl 9 mg/ml	Etter fortynning: Brukes umiddelbart	
LABETALOL S.A.L.F (labetalol) 5 mg/ml inj.væske 20 ml amp	IV injeksjon: 50 mg (10 ml) over minimum 1 min	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,5
	IV infusjon etter legens ordinasjon	Fortynnes i glukose 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml Anbefalt konsentrasjon: 1 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
METOCLOPRAMIDE Se Afipran				
METOPOCOR (metoprolol) 1 mg/ml inj.væske 5 ml amp	IV injeksjon Se EK: Seloken ved raske arytmier	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,10
MONOFER (jern(III)isomaltosid) 100 mg/ml inf/inj.væske 1 ml, 5 ml og 10 ml hettegl	IV injeksjon Opptil 250 mg jern/minutt	Ufortynnet eller fortynnet i maks 20 ml NaCl 9 mg/ml	Anbrutt hetteglass: 12 timer RT 24 timer K	1,2
	IV dråpeinfusjon etter legens ordinasjon	Fortynnes i maks 500 ml NaCl 9 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
MORFIN (morfin) 1 mg/ml inj. væske 1 ml amp 10 mg/ml inj.væske 1 ml amp og 10 ml hgl 20 mg/ml inj.væske 10 ml hgl 40 mg/ml inj.væske 10 ml hgl Alle preparatene er ukonservert	IV injeksjon: over 3-5 min Kan også gis IM og SC	Ufortynnet	Rester i åpnete ampuller kastes For 1, 10 og 20 mg/ml: Anbrutt hettegl: 12 timer RT/ 24 timer KJ	1,4,5, 13
	IV og SC infusjon: etter legens ordinasjon	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	For 40 mg/ml: 12 timer i RT (risiko for utfelling ved oppbevaring i KJ) Etter fortynning: 24 timer RT OBS! Nytt hetteglass anbruyes ved tillaging av smertepumpe	
NEXIUM (esomeprazol) 40 mg inf. substans hettegl	IV injeksjon: over minst 3 min	40 mg (1 hgl) løses i 5 ml NaCl 9 mg/ml Konsentrasjon: 8 mg/ml	Anbrutt hetteglass: 12 timer RT Etter fortynning: 12 timer RT	1
	IV infusjon: over 10 -30 min	40 mg-80 mg løses i 100 ml NaCl 9 mg/ml		
	Kont. infusjon Infusjonshastighet: 8 mg/t over 71,5 timer	2 x 40 mg (80 mg) løses i 100 ml NaCl 9 mg/ml Konsentrasjon: 0,8 mg/ml		
NALOXON (nalokson) 0,4 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IV: 0,1 – 0,2 mg iv Gjenta evt. med doser på 0,1 mg hvert 2-3 min. til resp. frekvens ≥ 12 og sedasjonsnivå 0-1 Vurder ny gjentakelse innen 1-2 timer IM: kun når IV adm ikke er mulig	Ufortynnet	Rester i åpnete ampuller kastes Etter fortynning: 24 timer RT	1,3,4,6
	IV infusjon: etter legens ordinasjon	Fortynnes med NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml.		
	IV infusjon opioidtilvente pasienter: Tynn ut til 0,04 mg/ml	Fortynnes med NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml.		

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
LEVOMEPROMAZIN (levomepromazin) 25 mg/ml inj. væske 1 ml ampulle <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: gis over minst 3 minutter	25 mg (1 ml) fortynnes med 9 ml NaCl 9 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes	2
	Kan også gis IM	Konsentrasjon: 2,5 mg/ml	Etter fortynning: benyttes umiddelbart	
NOVALGIN (metamizol) 1 g/2 ml (500mg/ml) 2 ml amp <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: maks 500 mg/min dvs 1 ml/min Kan også gis IM	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	2,4
	IV infusjon:	Kan fortynnes med NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
ONDANSETRON (ondansteron) 2 mg/ml inj.væske 2 ml og 4 ml amp	IV injeksjon: 30 sek	Ufortynnet doser ≤ 8 mg,	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: over minst 15 min For pasienter ≥65 år bør dosen gis som IV infusjon Hos pasienter ≥75 år skal dosen gis som IV infusjon	Kan fortynnes med NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml Doser på >8 mg og ≤16 mg må fortynnes i 50-100 ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
OXYCODONE (oksykodon) 10 mg/ml inf/inj.væske 1 ml og 2 ml amp 50 mg/ml inf/inj.væske 1 ml amp	IV injeksjon: over 1-2 min	Fortynnes fortrinnsvis til 1 mg/ml i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4,12
	IV infusjon Etter legens ordinasjon	10 mg/ml kan også gis ufortynnet	Etter fortynning: 24 timer i RT	
	Kan også gis som SC injeksjon og SC infusjon	Ufortynnet (10 mg/ml)		
PABRINEX IV Ampulle 1, 5 ml: tiamin (B1) 250 mg riboflavin (B2) 4 mg pyridoksin (B6) 50 mg Ampulle 2, 5 ml: askorbinsyre (C) 500 mg nikotinamid 160 mg glukose 1g <i>Uregistrert preparat</i>	IV injeksjon: over 10 min	Innholdet i ampulle 1 og 2 trekkes opp i samme sprøyte og blandes	Etter fortynning: 7 timer i RT	2,3
	IV infusjon: over 30 min	Like volum av innholdet i ampulle 1 og 2 tilsettes 50-100 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml		

Blandetabell legemidler til parenteral bruk for voksne

Versjon:
10.00

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
PABRINEX IM Ampulle 1, 5 ml: tiamin (B1) 250 mg riboflavin (B2) 4 mg pyridoksin (B6) 50 mg Ampulle 2, 2 ml: askorbinsyre (C) 500 mg nikotinamid 160 mg <i>Uregistrert preparat</i>	IM	Innholdet i ampulle 1 og 2 trekkes opp i samme sprøyte og blandes		2,3
PILEXAM (traneksamsyre) 100 mg/ml inj.væske 5 ml amp	IV injeksjon: maks. hastighet 100 mg/min = 1 ml/min	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	Korttidsinfusjon: maks. hastighet 100 mg/min	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
PANTOPRAZOL (pantoprazol) 40 mg pulver til inj.væske	IV injeksjon: over 2-5 min	40 mg løses opp i 10 ml NaCl 9 mg/ml	Etter rekonstituering og/eller fortynning: 12 timer RT	1,3
	IV infusjon: over 15 min	40 mg løses opp i 100 ml NaCl 9 mg/ml (adapter)		
PARACETAMOL (paracetamol) 10 mg/ml inf.væske 50 ml og 100 ml plastfl.	IV infusjon: over 15 min	Ufortynnet	Brukes umiddelbart, rester skal kastes.	1
POLARAMIN Se Dexclorfeniramin Accord				
SANDOSTATIN (oktreotid) 50 og 100 mikrogram/ml inj.væske, 1 ml amp 200 mikrogram/ml inj.væske, 5 ml hettegl	SC	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: etter legens ordinasjon	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml	Anbrutt hettegl: 2 uker i RT Etter fortynning: 24 timer RT	
SANDOSTATIN LAR (oktreotid) 10 mg, 20 mg, 30 mg pulver og væske Hettegl og ferdigfylt sprøyte	IM	Se pakningsvedlegg for tilberedning		1
SELOKEN Se Metopocor				

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
SKOPOLAMINBUTYLBROMID KALCEKS (butylskopolamin) 20 mg/ml inj.væske 1 ml amp	IV injeksjon: over minst 1 min Kan også gis IM og SC	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: etter legens ordinasjon	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT/KJ	
SOLU-CORTEF (hydrokortison) 100 mg og 250 mg pulver og væske tokammerhetteglass	IV injeksjon: doser opp til 500 mg over minst 30 sekunder. Doser på 500 mg eller mer gis over minst 10 minutt. Kan også gis IM	Se pakningsvedlegg for tilberedning av Act-O-Vial	Etter fortynning: 24 timer RT	1,3
	IV infusjon: 100 ml gis over 20 minutter Ved fortynning i større volum: juster til passende inf.hastighet	100 mg oppløsningen blandes med 100-1000 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml 250 mg oppløsningen blandes med 250-1000 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml		
SOLU-MEDROL (metylprednisolon) 40 mg, 125 mg, pulver og væske tokammerhetteglass 500 mg og 1 g Hetteglass	IV injeksjon: doser opp til 250 mg gis som IV injeksjon over minimum 5 min	Se pakningsvedlegg for tilberedning av Act-O-Vial	Etter fortynning: 24 timer RT	1,3
	IV infusjon: doser på 250 mg eller mer gis som IV infusjon over minimum 30 min	Fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml		
THIAMINE STEROP (tiamin) 50 mg/ml inj. væske 2 ml ampuller 125 mg/ml inj. væske 2ml ampuller	IV infusjon: Fortynnes før administrasjon IV infusjon over 30 minutt	Fortynnes i 50-250 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 8 timer RT/KJ	1
	IM injeksjon: gis dypt i en stor muskelmasse (øvre ytre kvadrant av baken eller den laterale delen av låret)	Ufortynnet	Rester i åpne ampuller kastes	
TIACUR Se Bevitine				

Legemiddel	Administrasjon	Utblanding	Holdbarhet	Ref.
TRANDATE Se Labetalol				
TRANEXAMIC ACID Se Pilexam				
VALOID Se cyclizine (/syklizine)				
ZANTAC (ranitidine) 25 mg/ml inj.væske 2 ml amp	IV injeksjon: over minimum 2 min Kan også gis IM	Dosen (50 mg) fortynnes i NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml til 20 ml	Rester i åpne ampuller kastes	1,3,4
	IV infusjon: over 2 timer	Dosen fortynnes i 50 – 100 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml	Etter fortynning: 24 timer RT	
	Kontinuerlig infusjon: 0,125 - 0,250 mg/kg/time	Dosen fortynnes i 100 ml NaCl 9 mg/ml		
ZYPREXA (olanzapin) 10 mg pulver	IM	10 mg løses opp i 2,1 ml sterilt vann Konsentrasjon ferdig løsning: 5 mg/ml	Etter oppløsning: 1 time RT	1

1 Endringslogg

Versjon 10, april 2025

Morfin – Lagt inn informasjon om at Morfin 40 mg/ml (NAF) ikke skal oppbevares i kjøleskap pga risiko for utfelling, ref 13. Lagt til 1 mg/ml.

Oppdatert tabell iht. LIS-enderinger 2025:

Butylskopolamin – Byttet preparat fra Buscopan til Skopolaminbutylbromid Kalceks, ingen endringer i informasjon

Deksamentason – Byttet preparat fra Dexavit til Dexamethasone (phosphate) hameln. Lagt til mulighet for SC adm av Dexamethasone hameln. Lar Dexavit stå i tabellen, ettersom Dexamethasone hameln inneholder propylenglykol, og derfor skal Dexavit benyttes videre i noen klinikker.

Deksklorfeniramin – Byttet preparat fra Polaramin til Dexchlorfeniramin Accord, ingen endringer i informasjon

Ketorolak – Byttet preparat fra Toradol til Caloket, ingen endringer i informasjon

Versjon 9, nov 2024

Oxycodone – lagt til informasjon om bruk av uførtynnet oxycodone 10 mg/mL

Versjon 8, feb 2023

Lagt til setning i innledningen om valg av væskevolum

Levomepromazin – endret preparat

Solu-Cortef – lagt til anbefaling for administrasjon ved IV injeksjon (ref. [Micromedex](#))

L-thyroxine SERB – endret utblanding fra sluttvolum 2 mikrog/ml til 250 ml NaCl (ref. SPC)

Thiamine Sterop – nytt preparat

Versjon 7, jan 2022

Aspirin – Nytt preparat

Versjon 6, jan 2022

Oppdatert tabell iht. LIS-enderinger 2022.

Labetalol S.A.L.F erstatter Trandate. Lagt til NaCl 9 mg/ml som utblandingsvæske.

Morfin abcur erstatter Morphine orion

2 Referanser

1. [Legemiddelsøk - SPC](#): Norsk preparatomtale for aktuelt preparat
2. Utenlandsk preparatomtale (SPC) for aktuelt preparat
3. Injectable Medicines Administration Guide, 3. Ed., oktober 2010, The Pharmacy Department University College London Hospitals, Wiley-Blackwell
4. [Sterile legemidler - veiledende brukstid og oppbevaring etter anbrudd](#)
5. [Legemidlertilbarn.no - blandekort](#), gjeldende blandekort for aktuelt legemiddel
6. [Retningslinjer og overvåkningsskjema for akutt- og postoperativ smertebehandling av voksne m/opioid SC/IV](#)
7. [Tiacur \(Tiamin\) \(ARKIVERT\)](#) (Tiacur), MIO
8. [Cordaroneinfusjon \(amiodaron\) for voksne](#), MIO
9. [Ferinject - adm. av jerninfusjon](#), med.avd
10. [Seloken ved raske arytmier](#), hjerte,
11. [Micromedex](#)
12. American Society of Health-Systems Pharmacists. (2018). *Handbook on injectable drugs: ASHP's guide to IV compatibility and stability* (20. utg., side 1029).
13. Preparatmonografi fra apotek.no

Dette er en revidert og utvidet versjon av en tabell som har vært i bruk ved Kirurgisk klinikk. Tabellen er utarbeidet av farmasøyter ved Sjukehusapoteket i Bergen.