

 <b>HELSE BERGEN</b> <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Rekonstituering av erytromycin</h2>	
Kategori: Pasientbehandling/Legemidler/Fagspesifikke retningslinjer	Gyldig fra/til: 18.11.2024/18.11.2025	
Organisasjonell plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 1.04	
Godkjenner: Bjånes, Tormod Karlsen - legemiddelkomiteen	Vedlegg	
Dok. ansvarlig: Legemiddelkomiteen	Dok.id: D67712	

Sykehusapoteket har fått flere tilbakemeldinger om at erytromycin pulver til infusjonsvæske er vanskelig å få løst opp. Dette gjelder flere produsenter.

**Ifølge legemiddelprodusentene kan følgende tiltak gjøre rekonstituering av pulveret raskere:**

- Bank glasset forsiktig for å løsne pulveret fra bunnen.
- Rist glasset, slik at store partikler brytes ned.
- Varm glasset i hånden i minst 45 sekunder, slik at det når kroppstemperatur.
- Stikk inn kanyle/adapter/Mix-Ad-sett og tilfør væske under risting.
- Rist til alt er helt oppløst.
- Det bør ikke ta mer enn 6 minutter å løse opp pulveret. Hvis det tar lengre tid, har glasset blitt varmet opp for kort tid.

For informasjon om oppløsningsvæske, infusjonsvæske, holdbarhet og administrasjonstid se [Blandetabell antibiotika - voksne](#).

Ved ytterligere spørsmål, kontakt Sjukehusekspedisjonen på telefon 97 53 44 (tast 2), eller farmasøyt tilknyttet din enhet.

**Interne referanser:**

[1.2.2.6.3-03](#)

[Blandetabell antibiotika - voksne](#)