Rusmiddel i urin - Tabell med analytter i basispakke

Sentralstimulerende	
Amfetamin	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Efedrin	Påvises vanligvis i inntil 4 dager etter siste inntak.
Kokain	Påvises vanligvis i inntil 4 dager etter siste inntak.
Benzoylekgonin	Viser inntak av kokain. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak. Kan påvises lenger ved store inntak.
Metamfetamin	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Metylendioksyamfetamin (MDA)	Viser inntak av MDA eller MDMA. Påvises vanligvis i inntil 4 dager etter siste inntak.
Metylendioksymetamfetamin (MDMA)	Påvises vanligvis i inntil 4 dager etter siste inntak. Betegnelsen ecstasy brukes om en rekke beslektede stoffer, der MDMA er det mest brukte.
Metylfenidat	
Ritalinsyre	Viser inntak av metylfenidat. Påvises vanligvis inntil 2 dager etter siste inntak.
Parametoksyamfetamin (PMA)	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Parametoksymetamfetamin (PMMA)	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Benzodiazepiner og liknende	
Alprazolam	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Diazepam	
Desmetyldiazepam (DMD, nordiazepam)	Viser inntak diazepam. Påvises vanligvis inntil 1 uke etter siste inntak, men betydelig lenger etter jevnt høyt inntak.
Etizolam	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Hydroksyetizolam	Viser inntak av etizolam. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Flunitrazepam	
7-Aminoflunitrazepam (7-AF)	Viser inntak av flunitrazepam. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Klonazepam	
7-Aminoklonazepam (7-AK)	Viser inntak av klonazepam. Påvises vanligvis inntil 1 uke etter siste inntak, men betydelig lenger etter jevnt høyt inntak.
Lorazepam	Viser inntak av lorazepam og/eller lormetazepam og/eller diklazepam. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Midazolam	Påvises vanligvis 1-2 dager etter siste inntak
Hydroksymidazolam	Viser inntak av midazolam. Påvises vanligvis 1-2 dager etter siste inntak.
Nitrazepam	
7-Aminonitrazepam (7-AN)	Viser inntak av nitrazepam. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Oksazepam	Viser inntak av oksazepam og/eller diazepam og/eller temazepam. Påvises fra 2-14 dager etter siste inntak.

Temazepam (hydroksydiazepam)	Viser inntak av temazepam og/eller diazepam. Påvises fra 2-14 dager etter siste inntak.
Zolpidem	
Zolpidem-fenyl-4-karboksylsyre	Viser inntak av zolpidem. Påvises vanligvis inntil 4 dager etter siste inntak.
Zopiklon	
Norzopiklon	Viser inntak av zopiklon. Påvises vanligvis inntil 4 dager etter siste inntak.
Opioider	
Buprenorfin	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Norbuprenorfin	Viser inntak av buprenorfin. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak. Ved påvisning av buprenorfin uten norbuprenorfin kan en ta kontakt med vakthavende klinisk farmakolog for diskusjon av prøvesvar (55 97 31 53).
Etylmorfin	Finnes i reseptbelagt hostesaft. Påvises vanligvis 1-3 dager etter siste inntak.
Fentanyl	Påvises vanligvis inntil 2-3 dager etter siste inntak.
Norfentanyl	Viser inntak av fentanyl. Påvises vanligvis inntil 5 døgn etter siste inntak.
Heroin	
6-Monoacetylmorfin (6-MAM)	Viser inntak av heroin. Påvises vanligvis inntil 12 timer etter siste inntak.
Kodein	Påvises vanligvis 1-3 dager etter siste inntak.
Metadon	Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak. Dersom EDDP (metabolitt) ikke er påvist, kan kontaminering eller manipulering av prøvematerialet ikke utelukkes.
Etylidendimetyldifenylpyrrolidin (EDDP)	Viser inntak av metadon. Påvises vanligvis inntil 7 dager etter siste inntak.
Morfin	Viser inntak av ett eller flere opiater. Påvises vanligvis 1-3 dager etter siste inntak.
Oksykodon	Påvises vanligvis inntil 4 dager etter siste inntak.
Tapentadol	Påvises vanligvis 1-3 dager etter siste inntak.
Tramadol	Påvises vanligvis inntil 2-4 dager etter siste inntak.
O-desmetyltramadol	Viser inntak av tramadol. Påvises vanligvis inntil 2-4 dager etter siste inntak.
Cannabis	
Tetrahydrocannabinolsyre (THC-COOH)	Viser inntak av cannabis. Påvises vanligvis inntil 10 dager etter siste inntak. Ved langvarig høyt inntak betydelig lengre påvisningstid.
Andre	
Gabapentin	Lite dokumentasjon foreligger, men påvises trolig som pregabalin i 2-3 dager, og i enkelte tilfeller inntil 5-6 dager etter siste inntak.
Ketamin	Påvises vanligvis inntil 2-3 dager etter et enkeltstående inntak. Etter multiple inntak er det rapportert om påvisningstid opp til 11 dager.

Pregabalin	Påvises vanligvis i 2-3 dager, og i enkelte tilfeller inntil 5-6 dager etter siste inntak.
LSD	Påvises vanligvis 2-4 dager etter siste inntak.
2-oxo-3-OH-LSD	Viser inntak av LSD. Påvises vanligvis 2-4 dager etter siste inntak.