

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Oversikt over barneprotokoller på CT - Gastro</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Radiologi	Gyldig fra/til: 21.12.2023/21.12.2024
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 1.02
Godkjenner: Fjell, Else-Gunn Bøe	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Trond Bergesen	Dok.id: D77479

Oversikt over barneprotokoller på CT - gastro

BA01 Abdomen bekken rutine [20.3.2.1.1-02](#)

Indikasjon:

Utredning/kontroll av tumor, metastaser, abscess og traume.

Forberedelse: pvk, ev. vannregime

Antall serier: 1

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2ml/kg, flow etter pvk ca 2ml/s

Serier:

1. Kontrastinjeksjonstid + 40s: fra diafragma til gjennom bekkenet.

BA02 Abdomen bekken uten ivk [20.3.2.1.1-03](#)

Indikasjon:

Nyresvikt.

Forberedelse: ev. vannregime

Antall serier: 1

Kontrast: NEI

Serier:

1. Fra diafragma til gjennom bekkenet.

BA03 Urinveier lavdose [20.3.2.1.1-04](#)

Indikasjon:

Utredning nyrestein /supplere eks ul.

Antall serier: 1

Kontrast: NEI

Serier:

1. Fra nyrepol til gjennom blæren

BA03b Urinveier Dual Energy [20.3.2.1.1-05](#)

Indikasjon:

Utredning/ klassifisering av nyrestein.

Antall serier: 1

Kontrast: NEI

Serier:

1. Fra nyrepol til gjennom blæren

BA05 Lever 2 faser [20.3.2.1.1-06](#)**Indikasjon:**

Primær levertumor/arteriell anatomi /lever transplantasjon/ hypervaskulære metastaser.

Forberedelse: pvk,

Antall serier: 2

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2,5 ml/kg, flow etter pvk ca 2-4ml/s

Serier:

1. Bolustracking, CTA gjennom lever, ev. lenger om ønsket.
2. Kontrastinjeksjonstid + 35s: fra diafragma til gjennom bekkenet.

BA06 Tarmblødning [20.3.2.1.1-07](#)**Indikasjon:**

Tarmblødning.

Forberedelse: pvk

Antall serier: 3

Kontrast: JA. Singelinjeksjon 2,5 ml/kg, flow etter pvk ca 2-4ml/s

Serier:

1. Uten ivk, fra diafragma til gjennom bekkenet.
2. Bolustracking, CTA fra diafragma til gjennom bekkenet.
3. 40s. fra diafragma til gjennom bekkenet.