

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Blødning etter tonsillektomi/tonsillotomi. Barnekirurgen.
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Øre-nese-hals	Gyldig fra/til: 26.06.2024/26.06.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Barne- og ungdomsklinikken/Barnekirurgen	Versjon: 1.01
Godkjenner: Aarvik, Anette Tysnes	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Ingvild Engesæter	Dok.id: D78431

Innhold

1	Prosedyrens formål.....	1
2	Pasienter prosedyren gjelder for	1
3	Helsepersonell prosedyren gjelder for	1
4	Ansvar	1
5	Blødning etter tonsillektomi/tonsillotomi	2
6	Referanser.....	3
7	Endringer siden forrige versjon.....	3

1 Prosedyrens formål

Retningslinjen skal sikre at barn og unge med blødning etter tonsilleoperasjon (tonsillektomi eller tonsillotomi) får adekvat og kunnskapsbasert postoperativ sykepleie. Videre skal prosedyren sikre felles rutiner og behandling, og tilrettelegge for faglig forsvarlig sykepleie tilpasset pasientens behov.

2 Pasienter prosedyren gjelder for

Inneliggende barn og ungdom <18 år med blødning etter tonsilleoperasjon.

3 Helsepersonell prosedyren gjelder for

Sykepleiere og helsefagarbeidere med ansvar for barn og ungdom < 18 år med blødning etter tonsilleoperasjon.

4 Ansvar

Seksjonsledere for nivå 3 har ansvar for at retningslinjen er tilgjengelig og kjent. Arbeidstaker er pliktig til å holde seg oppdatert om avdelingens retningslinje og følge dem. Retningslinjen er veiledende, hvilket betyr at vurderinger må gjøres kontinuerlig for å tilby best mulig behandling.

5 Blødning etter tonsillektomi/tonsillotomi

Blødning etter tonsillektomi forekommer hyppigst i løpet av første 24 timer og kan oppstå til og med tre uker etter kirurgi. Ifølge Norsk Tonsilleregister 2022 ble 4% av barn <12 år reinnlagt på grunn av blødning postoperativt. Det er hyppigst med blødning hos voksne, men risiko for livstruende blødning er større hos barn.

Blod i spyttet

Etter tonsilleoperasjon er det normalt at det kan komme litt blod i spyttet. Observeres dette skal barnet suge på isbiter eller spise saftis. Vedvarer blødningen kontaktes operatør for tilsyn av barnet.

Ved blødning utover lett blodspor i spyttet skal operatør kontaktes umiddelbart for tilsyn!

Er ikke operatør tilgjengelig, kontakt ØNH forvakt barn.

Barn vil ikke alltid gi beskjed dersom de svelger blod. Mørkt kaffegrutlignede oppkast og/eller hyppig svelging kan være tegn på «skjult blødning» hos barn.

Under operasjonen kommer det blod ned i magesekken, dette kan forårsake kvalme. Dersom barnet kaster opp – observer om det er friskt eller gammelt blod.

Observeres friskt blod - kontakt operatør!

Ved akutt blødning

- Utløs nødalarm på pasientrommet.
- Sett pasienten høyt i sengen, la pasienten lene seg fremover mens blodet renner ned i et pussbekken.
- To personer transporterer pasient til SOP, mens øvrig personell informerer ØNH forvakt barn og anestesilege.

ØNH forvakt barn (dagtid): 97-0310/41701816

ØNH forvakt: 97-0410/41701817

Anestesilege ØNH: 97-2547/93-2547

Pasienter som innlegges grunnet blødning etter tonsilleoperasjon skal ha 2 venefloner. Dette for å sikre mulighet til å gi blod + væske dersom det oppstår ny blødning.

Etter tonsiblødning skal pasienten vanligvis observeres i 24 timer før utskrivelse.

6 Referanser

Interne referanser

-

-

Eksterne referanser

Messner, A. H. (2023). Tonsillectomy and/or adenoidectomy in children: Preoperative evaluation and care. Hentet 26.03.2024 fra: https://www.uptodate.com/contents/tonsillectomy-and-or-adenoidectomy-in-children-preoperative-evaluation-and-care?search=tonsillectomy&topicRef=6296&source=see_link

Wennberg, S. (2019) Årsrapport. Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals-Tonsilleregisteret. Hentet 26.03.2024 fra: <https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/2023-06/%C3%85rsrapport%202022%20Tonsilleregisteret.pdf>

7 Endringer siden forrige versjon